




CHEK2 HOMMES



Les lignes directrices du National Comprehensive Cancer Network (NCCN) pour la prise en charge médicale des patients porteurs d'un variant pathogénique/probablement pathogénique CHEK2 sont énumérées dans ce document.

Cette vue d'ensemble est fournie à titre informatif et ne constitue pas une recommandation individualisée. **Les options recommandées peuvent varier selon vos antécédents personnels et familiaux. L'accès à certaines options peut également varier d'un centre médical à un autre.** Les références spécifiques devraient être consultées pour plus de détails avant d'élaborer un plan de traitement.

De plus, les informations disponibles sur les gènes de prédisposition au cancer héréditaire sont en constante évolution et **il est recommandé de vérifier annuellement ces informations car les directives de prise en charge pourraient changer dans le futur.**



* Les données préliminaires suggèrent une possible augmentation du risque de cancer de la prostate.

Actuellement, nous ne disposons pas de suffisamment de données pour fournir des estimations de risque fiables. Davantage de recherche est requise afin de comprendre les interactions de CHEK2 et le risque associé de développer un cancer de la prostate au cours de la vie.

Références:

Daly M et coll. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian and Pancreatic. Version 3.2025-March 6, 2025. <http://www.nccn.org>

Gupta S et coll. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Genetic/Familial High-Risk Assessment: Colorectal, Endometrial, and Gastric. Version 4.2024. April 2, 2025. <http://www.nccn.org>



CANCER COLORECTAL

DÉPISTAGE

À PARTIR DE 40 ANS

INDIVIDU NON ATTEINT **AVEC** UN MEMBRE DE LA FAMILLE APPARENTÉ AU PREMIER DEGRÉ (PARENT, ENFANT, FRÈRE OU SOEUR) ATTEINT DE CANCER COLORECTAL.

- COLONOSCOPIE À CHAQUE 5 ANS À PARTIR DE 40 ANS OU 10 ANS AVANT LE PLUS JEUNE CANCER COLORECTAL DANS LA FAMILLE.



40

À PARTIR DE 40 ANS

- ENVISAGER UN DÉPISTAGE DU CANCER DE LA PROSTATE (TOUCHER RECTAL ET DÉPISTAGE SANGUIN PSA) TOUS LES 12 MOIS.

CANCER DE LA PROSTATE

DÉPISTAGE

À PARTIR DE 40 ANS

- ENVISAGER UN DÉPISTAGE DU CANCER DE LA PROSTATE (TOUCHER RECTAL ET DÉPISTAGE SANGUIN PSA) TOUS LES 12 MOIS.